

AVVISO DEL 3 giugno 2014

Flavescenza dorata della Vite

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE

Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione

Si ricorda la Legge regionale 3/8/98, n. 20 che tutela la

Salvaguardia degli insetti pronubi

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento, non trattare a filari alterni)

INDICAZIONI TECNICHE

Aziende biologiche: tre applicazioni di piretro naturale, il primo trattamento dovrà essere effettuato subito dopo la fine della fioritura e ripetuto ogni 7-10 giorni.

Aziende convenzionali che intendono utilizzare il Buprofezin il trattamento dovrà essere effettuato subito dopo la fine della fioritura, entro una settimana dalla fine della stessa.

Aziende convenzionali che non utilizzano il Buprofezin non devono ancora trattare. Attendere il prossimo comunicato.

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.